

القدرات المستهدفة

- التعبير عن توازي و تعامد مستقيمين .
- حساب مساحات و قياسات زوايا باستعمال الجداء السلمي.

I - الجداء السلمي "تذكير"نشاط رقم 1

ليكن  $ABC$  و  $H$  المسقط العمودي للنقطة  $A$  على  $(BC)$

بحيث  $AB = 2$  و  $AC = 5$  و  $BC = 4$  و  $BH = 1$  و  $\hat{ACB} = \frac{\pi}{4}$  .

1 - أحسب الجداء السلمي  $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$

2 - أحسب الجداء السلمي  $\vec{BA} \cdot \vec{BH}$

3 - حدد قياسا للزاوية  $\hat{ABH}$

4 - أحسب الجداء السلمي  $\vec{AH} \cdot \vec{BC}$

1 - الصيغة المثلثية للجداء السلميتعريف:

•  $A$  و  $B$  و  $C$  ثلاث نقط من المستوى بحيث  $A \neq C$  و  $A \neq B$

• الجداء السلمي للمتجهين  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$  هو العدد  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \times \cos \hat{BAC}$

•  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتين غير منعدمتين .

• الجداء السلمي للمتجهتين  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  هو العدد  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

ملاحظة:

- إذا كانت  $\alpha = 0$  فإن  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC$  و  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$

- إذا كانت  $\alpha = \pi$  فإن  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AC$  و  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AC$

2 - صيغة الإسقاط للجداء السلمي.

•  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$  متجهتين غير منعدمتين في المستوى و  $C'$  المسقط العمودي للنقطة  $C$  على المستقيم  $(AB)$

• الجداء السلمي للمتجهتين  $\vec{AB}$  و  $\vec{AC}$  هو العدد الحقيقي  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$  المعروف بـ  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AC'}$

خاصية:

• لتكن  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتين غير منعدمتين .

• تكون المتجهتان  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متعامدتين و نكتب  $\vec{u} \perp \vec{v}$  إذا و فقط إذا كان  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

3 - خاصيات الجداء السلمي.

• لتكن  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\vec{w}$  متجهات و  $k \in \mathbb{R}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$(k \vec{u}) \cdot \vec{v} = k \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$$



تمرين تطبيقي رقم 1

1 -  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتان و  $\alpha$  قياس الزاوية  $(\vec{u}, \vec{v})$

أ - أحسب  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  علما أن  $\|\vec{u}\| = 3\sqrt{3}$  و  $\|\vec{v}\| = \sqrt{3}$  و  $\alpha = \frac{\pi}{6}$

ب - أحسب  $\|\vec{u}\|$  علما أن  $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$  و  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}$  و  $\alpha = \frac{\pi}{4}$

ج - أحسب  $\cos \alpha$  علما أن  $\|\vec{u}\| = 3$  و  $\|\vec{v}\| = 2$  و  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$



القدرات المستهدفة

- التعبير عن توازي و تعامد مستقيمين .  
- حساب مساحات و قياسات زوايا باستعمال الجداء السلمي.

2 -  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتان بحيث  $\vec{u}^2 = 2$  و  $\vec{v}^2 = 3$  و  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$  .  
أ - أحسب  $(\vec{u} + 2\vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

ب - بين أن  $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$  .

II - الصيغ التحليلية1 - الجداء السلمينشاط رقم 2

نعتبر متجهتين  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  في المستوى  $(P)$  المنسوب لمعلم متعامد منظم  $(\vec{i}, \vec{j})$

بحيث  $\vec{u}(x, y)$  و  $\vec{v}(x', y')$  .

أكتب الجداء السلمي  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  بدلالة  $x$  و  $x'$  و  $y$  و  $y'$  .

خاصية :

المستوى  $(P)$  منسوب لمعلم متعامد منظم  $(\vec{i}, \vec{j})$  .

إذا كانت  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتين بحيث  $\vec{u}(x, y)$  و  $\vec{v}(x', y')$  في الأساس  $(\vec{i}, \vec{j})$

فإن  $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

2 - إحداثيتا متجهة في أساس متعامد منظم مباشر.نشاط رقم 3

نعتبر متجهة  $\vec{u}(x, y)$  في أساس متعامد منظم  $(\vec{i}, \vec{j})$  .

1 - أحسب  $\vec{u} \cdot \vec{i}$  و  $\vec{u} \cdot \vec{j}$  .

2 - استنتج قيمة  $x$  و  $y$  بدلالة  $\alpha$  قياس الزاوية  $(\vec{i}, \vec{u})$  .

3 - أكتب  $\vec{u}$  بدلالة  $\cos \alpha$  و  $\sin \alpha$  .

خاصية :

إذا كان  $(x, y)$  هو زوج إحداثيتي متجهة غير منعدمة  $\vec{u}$  في أساس متعامد منظم مباشر  $(\vec{i}, \vec{j})$

و  $\alpha$  قياس الزاوية  $(\vec{i}, \vec{u})$  فإن  $\vec{u} = \|\vec{u}\|(\cos \alpha \vec{i} + \sin \alpha \vec{j})$  .

3 - منظم متجهة و المسافة بين نقطتيننشاط رقم 4

نعتبر النقطتين  $A(x_A, y_A)$  و  $B(x_B, y_B)$  في معلم متعامد منظم .

1 - حدد إحداثيتي المتجهة  $\overrightarrow{AB}$  .

2 - أحسب  $\|\overrightarrow{AB}\|^2$  ثم استنتج تعبيراً للمسافة  $AB$  .

خاصية :

إذا كانت  $A(x_A, y_A)$  و  $B(x_B, y_B)$  نقطتين في معلم متعامد منظم  $(\vec{i}, \vec{j})$

و إذا كانت  $\vec{u}(x, y)$  في الأساس  $(\vec{i}, \vec{j})$  فإن :

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$  و  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  .

4 - حساب  $\sin \alpha$  و  $\cos \alpha$  :نشاط رقم 5



نعتبر المتجهتين  $\vec{u}(x, y)$  و  $\vec{v}(x', y')$  في أساس متعامد منظم مباشر  $(\vec{i}, \vec{j})$  و  $\alpha$  قياس الزاوية  $(\vec{u}, \vec{v})$  .

1 - أحسب الجداء السلمي  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ثم استنتج  $\cos \alpha$  بدلالة  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  و  $\|\vec{u}\|$  و  $\|\vec{v}\|$  .

2 - نعتبر المتجهة  $\vec{w}$  بحيث  $(\vec{u}, \vec{w}) = \frac{\pi}{2}$  و  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$  .

أ - أحسب  $\vec{v} \cdot \vec{w}$  بدلالة  $\sin \alpha$  .

ب - أوجد تعبيراً لـ  $\sin \alpha$  بدلالة  $\|\vec{u}\|$  و  $\|\vec{v}\|$  و  $\det(\vec{u}, \vec{v})$  .



القدرات المستهدفة

- التعبير عن توازي و تعامد مستقيمين .
- حساب مساحات و قياسات زوايا باستعمال الجداء السلمي.

خاصية :

إذا كان  $\vec{u}$  و  $\vec{v}$  متجهتان غير منعدمتين و  $\alpha$  قياس الزاوية  $(\vec{u}, \vec{v})$  فإن :

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \text{ و } \sin \alpha = \frac{\det(\vec{u}, \vec{v})}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

تمرين تطبيقي رقم 2

$(\vec{i}, \vec{j})$  اساس متعامد ممنظم مباشر .

1 - أحسب  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  في الحالتين التاليتين :

أ -  $\vec{u} (3, -1)$  و  $\vec{v} (-2, 4)$  .

ب -  $\vec{u} (\sqrt{3} - \sqrt{2}, \sqrt{2} + 1)$  و  $\vec{v} (\sqrt{2} - 1, \sqrt{3} + 2)$  .

2 - حدد قيمة العدد  $m$  لكي تكون  $\vec{u} (2, m)$  و  $\vec{v} (3, -2)$  متعامدتين .

3 - نعتبر المتجهة  $\vec{u} (2, -3)$  . حدد المتجهات  $\vec{v} (x, y)$  بحيث يكون  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2$  و  $\|\vec{v}\| = 2$  .

4 - نعتبر المتجهتين  $\vec{u} (\sqrt{3} - 1, \sqrt{3} + 1)$  و  $\vec{v} (-1, 1)$  . أحسب  $\cos(\vec{u}, \vec{v})$  و  $\sin(\vec{u}, \vec{v})$  .

III - معادلة مستقيم معرف بمتجهة منظمية :1 - متجهة منظمية على مستقيم.نشاط رقم 6

نعتبر المستقيم  $(D)$  الذي معادلته :  $2x - 3y + 1 = 0$  .

1 - حدد متجهة  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(D)$  .

2 - بين أن المتجهات  $\vec{n} (2, -3)$  و  $\vec{n}' (6, -9)$  و  $\vec{n}'' (-10, 15)$  متعامدة مع المتجهة  $\vec{u}$  .

3 - بين أن المتجهات  $\vec{n} (2, -3)$  و  $\vec{n}' (6, -9)$  و  $\vec{n}'' (-10, 15)$  مستقيمتان مثلى مثلى .

تعريف :

$(D)$  مستقيم في المستوى .

كل متجهة غير منعدمة عمودية على متجهة موجهة للمستقيم  $(D)$  تسمى متجهة منظمية على  $(D)$  .

$\vec{u}$  متجهة موجهة للمستقيم  $(D)$   
و  $\vec{n}$  متجهة منظمية عليه .

ملاحظة:

- إذا كانت  $\vec{n}$  متجهة منظمية على  $(D)$  فإن كل متجهة  $k\vec{n}$  بحيث  $k \in \mathbb{R}$  منظمية عليه .

- إذا كانت  $\vec{n}$  متجهة منظمية على  $(D)$  و  $\vec{n}'$  متجهة منظمية على  $(D)$  فإن  $\vec{n}$  و  $\vec{n}'$  مستقيمتان .

- إذا كان  $\vec{u} (a, b)$  متجهة موجهة لمستقيم  $(D)$  فإن المتجهة  $\vec{n} (-b, a)$  منظمية عليه .

- إذا كان  $(D)$  مستقيم معادلته  $ax + by + c = 0$  فإن  $\vec{u} (-b, a)$  متجهة موجهة له و  $\vec{n} (a, b)$  منظمية عليه .

تمرين تطبيقي رقم 3

1 -  $(D)$  مستقيم معرف بتمثيله البارامترى  $t \in \mathbb{R} \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \end{cases}$  . حدد متجهة  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(D)$  و حدد متجهة  $\vec{n}$  منظمية على  $(D)$  .

2 -  $(D)$  مستقيم معرف بمعادلته  $3x - 4y + 3 = 0$  . حدد متجهة  $\vec{u}$  موجهة للمستقيم  $(D)$  و حدد متجهة  $\vec{n}$  منظمية على  $(D)$  .

3 -  $(D)$  مستقيم معادلته هي  $-x + 2y - 1 = 0$  .

أ - حدد معادلة المستقيم  $(D')$  الذي يمر من  $A (2, 1)$  و الموازي للمستقيم  $(D)$  .

ب - حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم  $(\Delta)$  المار من  $B (1, 0)$  و العمودي على المستقيم  $(D)$  .

2 - معادلة مستقيم معرف بنقطة و بمتجهة منظمية عليه.نشاط رقم 7

ليكن  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  معلم متعامد ممنظم. نعتبر المتجهة  $\vec{n} (3, -1)$  و النقطة  $A (-2, 4)$  .

1 - لتكن  $M (x, y)$  , حدد إحداثيتي المتجهة  $\overrightarrow{AM}$  ثم أحسب الجداء السلمي  $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}$  .

2 - بين أن مجموعة النقط  $M (x, y)$  التي تحقق العلاقة  $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$  هو المستقيم المار من  $A (-2, 4)$  و الموجه بالمتجهة  $\vec{u} (1, 3)$  .

القدرات المستهدفة

- التعبير عن توازي و تعامد مستقيمين .
- حساب مساحات و قياسات زوايا باستعمال الجداء السلمي.

خاصية :

لتكن  $\vec{n}(a,b)$  متجهة غير منعدمة و  $A(x_0,y_0)$  نقطة من المستوى.

مجموعة النقط  $M$  من المستوى التي تحقق العلاقة  $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$  هي المستقيم المار من النقطة  $A$  و الموجه بالمتجهة  $\vec{u}(-b,a)$  بمعنى آخر : هو المستقيم المار من النقطة  $A$  و المتجهة  $\vec{n}(a,b)$  منظمية عليه .

تمرين تطبيقي رقم 4

- 1 - حدد معادلة المستقيم  $(D)$  المار من النقطة  $A(2,3)$  و  $\vec{n}(2,-1)$  متجهة منظمية عليه .
- 2 - حدد معادلة المستقيم  $(D)$  المار من النقطة  $A(4,-2)$  و  $\vec{n}(\sqrt{2},-1)$  متجهة منظمية عليه .
- 3 - حدد معادلة المستقيم  $(D)$  واسط القطعة  $[AB]$  بحيث  $A(3,-1)$  و  $B(-1,5)$  .

3 - المسافة بين نقطة و مستقيم.نشاط رقم 8

- 1 - ليكن  $(D)$  مستقيم يمر من النقطة  $A(-1,-1)$  و  $\vec{n}(2,-1)$  متجهة منظمية عليه .  
أ - حدد معادلة المستقيم  $(D)$  .  
ب - حدد معادلة المستقيم  $(D')$  المار من  $M(3,2)$  و العمودي على المستقيم  $(D)$  .  
ج - حدد إحداثيتي النقطة  $H$  تقاطع  $(D)$  و  $(D')$  ثم استنتج المسافة بين النقطة  $M$  و المستقيم  $(D)$  .
- 2 - ليكن  $(D)$  مستقيم يمر من النقطة  $A(x_A, y_A)$  و  $\vec{n}(a,b)$  متجهة منظمية عليه .  
و  $M(x_M, y_M)$  نقطة من المستوى و  $H$  المسقط العمودي للنقطة  $M$  على المستقيم  $(D)$  .  
أ - بين أن  $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM}$  .  
ب - بين أن  $MH = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  .

مبرهنة :

المستوى  $(P)$  منسوب لمعلم متعامد منظم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

ليكن  $(D)$  مستقيم معادلته  $ax + by + c = 0$  بحيث  $(a,b) \neq (0,0)$  و  $M(x_M, y_M)$  نقطة من المستوى  $(P)$  .

مسافة النقطة  $M$  عن المستقيم  $(D)$  هي :  $d(M, (D)) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

تمرين تطبيقي رقم 5

- 1 - أحسب مسافة النقطة  $A$  عن المستقيم  $(D)$  في الحالات التالية :

أ -  $A(3,-1)$  و  $(D): 2x - 4y + 1 = 0$  .

ب -  $A(-2,1)$  و  $(D): x - 3y + 3 = 0$  .

ج -  $A(3,-2)$  و  $(D)$  معرف بتمثيله البارامتري  $\alpha \in \mathbb{R} \begin{cases} x = -2 + 3\alpha \\ y = -1 - 3\alpha \end{cases}$